

تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران (*Crocus sativus L.*) اسپانیایی و ایرانی

رامین نظریان^{*}، حسین صحابی^۱، حسن فیضی^۳ و احمد احمدیان^۴

تاریخ پذیرش ۶ مهر ۱۳۹۴

تاریخ دریافت ۲ شهریور ۱۳۹۴

چکیده

جهت بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران (*Crocus sativus L.*) اسپانیایی و ایرانی آزمایشی طی دو سال زراعی (۹۳-۹۴، ۹۲-۹۳) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور A نوع بنه (ایرانی و اسپانیایی) و فاکتور D تراکم کاشت (۰/۱۶، ۰/۴۰ و ۰/۶۰ بنه در مترمربع) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات تراکم‌های مختلف کاشت و نوع بنه بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک (کلاله + خامه) و تعداد بنه‌های دختری تولید شده معنی‌دار بود ($P<0.01$). در حالی که اثرات نوع بنه بر وزن تر و خشک بنه‌های دختری تولید شده معنی‌دار نبود. بیشترین تعداد گل (۳۰/۲۵ در مترمربع)، وزن تر گل (۱۵/۱۲۵ گرم در مترمربع) و وزن خشک کلاله + خامه (۰/۱۶ گرم در مترمربع) مربوط به تراکم کاشت ۰/۱۶ بند در مترمربع (d2) بود. همچنین بیشترین تعداد گل (۲۷/۲۱)، وزن تر گل (۱۳/۵۸ گرم در مترمربع) و وزن خشک گل (۱۴/۴ گرم در مترمربع) را بنه‌های ایرانی تولید کرد. در حالی که بیشترین تعداد بنه‌های دختری (۲۲/۸۳ بند در مترمربع) با وزن تر (۶۹/۴/۹۲ گرم در مترمربع) و وزن خشک (۲۷۰/۳۲ گرم در مترمربع) متعلق به نوع اسپانیایی بود. اثر سال نیز بر شاخص‌های گل و بنه زعفران معنی‌دار بود به طوری که بیشترین مقادیر در سال دوم آزمایش حاصل شد.

کلمات کلیدی: بنه دختری، تراکم بنه، عملکرد زعفران.

مقدمه

دهد به طوری که به آن لقب طلای سرخ داده‌اند. این گیاه به دلیل تریپلوبیود بودن عقیم است و به صورت رویشی و توسط بنه تکثیر می‌گردد (Kafi et al., 2002; Gresta et al., 2008). رشد زایشی در زعفران با سرد شدن هوا در پاییز و تشکیل گل آغاز می‌شود و پس از برداشت گل‌ها، رشد رویشی شروع و تا بهار سال بعد ادامه می‌یابد و سپس با زرد شدن و ریزش برگ‌ها زعفران وارد مرحله‌ی رکود می‌گردد (Kafi et al., 2002). در طی فصل رشد بنه مادری تحلیل رفت و بنه‌های دختری تشکیل

زعفران (*Crocus sativus L.*) از جمله ارزشمندترین گیاهان دارویی و گران‌بهاترین ادویه‌ها در دنیا است که کلاله‌ی سه‌شاخه قرمز گل مهم‌ترین بخش اقتصادی آن را تشکیل می-

۱- عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرات، افغانستان.
۲- عضو هیأت علمی و استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت حیدریه، ایران.

۳- استادیار گروه تولیدات گیاهی، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربیت حیدریه، ایران.
۴- نویسنده مسئول: ra_nazarian@yahoo.com.

هدف از اجرای این آزمایش بررسی تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران (*Crocus sativus* L.) اسپانیایی و ایرانی بود که طی دو سال زراعی (۹۲-۹۳، ۹۳-۹۴) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

مواد و روش‌ها

محل اجرای آزمایش و مدیریت مزرعه

جهت بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران (*Crocus sativus* L.) اسپانیایی و ایرانی آزمایشی طی دو سال زراعی (۹۲-۹۳، ۹۳-۹۴) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در ۱۰ کیلومتری شرق مشهد (به طول جغرافیایی ۵۹/۲۸ شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶/۱۵ شمالی و ارتفاع ۹۸۵ متر) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور A نوع بنه زعفران در دو سطح (بنه ایرانی و بنه اسپانیایی)، فاکتور D تراکم کاشت در سه سطح (۴۰، ۴۸ و ۶۰ بنه در مترمربع) به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد.

مقدار بنه مصرفی زعفران با توجه به تراکم کاشت متفاوت بود. ابعاد هر کرت جهت کاشت (یک مترمربع)، فاصله ردیف-های کشت ۲۵ سانتی‌متر و تعداد خطوط کشت در هر کرت ۴ ردیف منظور گردید. در تاریخ ۱۵ مهرماه با انتخاب بنه‌های ۸ گرم به بالا پس از خداغونی با کنه‌کش امایت نسبت به کشت زعفران اقدام شده و بالا فاصله آبیاری صورت گرفت. زمین قبل از کشت جهت آماده‌سازی شخم خورده و با دیسک کلوخه‌های آن نرم شد و عملیات تسطیح جهت پیاده نموده طرح انجام گرفت. برای مشخص نمودن خصوصیات خاک محل آزمایش، قبل از انجام عملیات خاک‌ورزی از نقاط مختلف مزرعه نمونه‌برداری خاک از اعماق ۰-۳۰ سانتی‌متر انجام شده و در آزمایشگاه خاک موردمطالعه و آنالیز قرار گرفت و خصوصیات آن تعیین شد (جدول ۱).

می‌گرددند که تعداد و اندازه آنها بر رشد زایشی و تولید گل در فصل بعد مؤثر است (Gresta et al., 2008; Renau-Morata et al., 2012).

عوامل متعددی بر مقدار عملکرد زعفران مؤثر می‌باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اندازه بنه مادری و انتخاب تراکم مناسب کاشت اشاره نمود. با افزایش وزن و اندازه بنه مادری، سطح برگ و تولید ماده خشک زعفران در طول فصل رشد افزایش یافته و درنتیجه تعداد بنه‌های دختری بیشتری تولید می‌شود (Koocheki et al., 2007; Renau-Morata et al., 2012). انتخاب بنه‌های درشت (با قطر ۳۵-۴۵ میلی‌متر) در هنگام کاشت باعث افزایش تعداد گل، عملکرد بیشتر کلاله و تولید بنه‌های دختری بیشتر در مقایسه با بنه‌های ریزتر می‌شود (Gresta et al., 2008). همچنین محققین تعیین تراکم و عمق مناسب کاشت را از مهم‌ترین عوامل افزایش کارایی استفاده از منابع موجود جهت افزایش عملکرد زعفران در واحد سطح می‌دانند (Beheshti & Faravani, 2003; Naderi et al., 2008). تراکم بوته در واحد سطح بستگی به نوع و روش کشت، عادت زارعین و اندازه بنه دارد. تحقیقات نشان داده که برای حصول حداقل عملکرد در زعفران تراکم ۵۰ بنه در مترمربع مناسب است (McGimssey et al., 1997). افزایش تراکم کاشت بنه زعفران از ۸ به ۲۱ تن در هکتار باعث افزایش عملکرد کلاله به صورت معنی‌داری شد، به‌طوری که بیشترین مقدار عملکرد گل و کلاله در تراکم ۱۱ تن و Koocheki et al., 2009) عمق کاشت ۱۵ سانتی‌متر حاصل گردید (همچنین با بررسی الگوهای مختلف کشت (ردیفی، تصادفی و کپهای) و تراکم‌های متفاوت بنه (۴، ۸ و ۱۲ تن در هکتار) دریافتند که بیشترین مقدار عملکرد گل زعفران در تیمار کشت ردیفی همراه با ۱۲ تن بنه در هکتار حاصل شد (Koocheki et al., 2009). در مطالعه‌ی دیگر گزارش شد که حداقل عملکرد گل (۵/۰ کیلوگرم در هکتار) از تراکم ۱۷۷/۶ بنه در مترمربع (Naderi et al., 2008) در سال سوم به دست آمده است (Darbaghshahi et al., 2008).

جدول ۱- خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک مزرعه
Table 1- Physicochemical characteristics of farm soil

اسیدیته pH	پتانسیم قابل جذب K (ppm)	فسفر قابل جذب P (ppm)	نیتروژن کل N (%)	کربن آلی O.C (%)	هدایت الکتریکی EC (dS.m ⁻¹)	بافت خاک Soil texture
7.6	475	14.8	0.08	0.6	0.8	سیلتی لوم Silty Loam

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت مقایسات میانگین‌های آزمایش از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) و در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد و نمودارهای مربوطه ترسیم گردید. لازم به ذکر است که بررسی ویژگی‌های بنه‌های دختری در گروه‌های مختلف وزنی در مقاله‌ی جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در این مقاله عملکرد گل و بنه زعفران در طی دو سال به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات در زمان و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی آنالیز شد (تراکم و نوع بنه به صورت فاکتوریل و گل‌دهی در طی دو سال به عنوان دو بار چین منظور گردید).

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص‌های گل و بنه زعفران نشان داد که اثرات تراکم‌های مختلف کاشت و نوع بنه بر تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک (کلاله + خامه) معنی‌دار بود ($P < 0.01$). همچنین اثرات سال بر نوع بنه و تراکم‌های مختلف کاشت نیز معنی‌دار شد درحالی که اثرات متقابل (A \times D \times Y) بر تعداد کل بنه، وزن تر گل، وزن خشک (کلاله + خامه) و تعداد گل معنی‌دار نبود (جدول ۲).

بیشترین تعداد گل (۳۰/۲۵ در مترمربع)، وزن تر گل (۱۵/۱۲۵ گرم در مترمربع) و وزن خشک کلاله + خامه (۰/۱۶ گرم در مترمربع) مربوط به تراکم کاشت ۴۸ بنه در مترمربع (d2) و کمترین مقدار مربوط به تراکم ۴۰ بنه در مترمربع (d1) بود (جدول ۳).

خاک مورد آزمایش با پی اج قلیایی، بافت خاک متوسط (سیلت لوم) و بدون محدودیت شوری مشخص شد و بر اساس عناصر موجود توصیه کودی صورت گرفت. سپس قبل از کشت کود حیوانی به میزان ۵۰ تن در هکتار و کود دی‌آمونیم فسفات (DAP) ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار با خاک مخلوط شد. همچنین با توجه به شرایط محیطی دور آبیاری تنظیم گردید. در ابتدا قبل از کشت مشخصات بنه‌های مورد آزمایش اندازه‌گیری شده و ثبت گردید و طی دوره گله‌ی نیز مقدار زعفران تولیدی اندازه‌گیری و ثبت گردید.

اندازه‌گیری صفات و آنالیز داده‌ها

برای مطالعه اثر تراکم و نوع بنه بر خصوصیات گل زعفران، مساحت یک مترمربع در نظر گرفته شد و در طول دوره گله‌ی نیز تعداد کل گل‌های جمع‌آوری شده از سطح مذکور ثبت و وزن تر و خشک گل و کلاله و خامه آنها با ترازو (با دقت ده‌هزار گرم) در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. برای تعیین خصوصیات بنه‌های دختری از هر کرت یک ردیف کاشت (۰/۲۵ مترمربع) در اردیبهشت‌ماه، زمانی که بنه‌ها در حال استراحت کامل بودند، برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس از لحاظ اندازه به سه گروه کمتر از ۸ گرم، بین ۸/۱ - ۱۵ گرم و ۱۵/۱ - ۲۳ گرم تقسیم شد و در انتهای اندازه‌گیری‌های بر روی بنه از لحاظ وزن، قطر و تعداد بنه‌های دختری تولید شده صورت گرفت و در جداول مربوطه ثبت گردید. نتایج حاصل از آزمایش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SAS Ver. 9 و Excel 2010 مورد

جدول ۲- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تراکم کاشت و نوع بنه بر شاخص‌های گل و بنه زعفران

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of different plant densities and corm type on saffron flower and corm characteristics

منابع تغییر (S.O.V)	درجه آزادی df	وزن خشک بنه Corm dry weight	وزن تر بنه Corm fresh weight	تعداد کل بنه Total corm number	وزن خشک (کالاله+خامه) Dry weight (Stigma +Style)	وزن تر گل Flower fresh weight	تعداد گل Flower number
بلوک (Block)	3	5414.25 ^{ns}	35779.38 ^{ns}	267.79 ^{ns}	0.002 ^{ns}	17.8 ^{ns}	69.7 ^{ns}
نوع بنه Corm type(A)	1	2004.02 ^{ns}	13243.48 ^{ns}	81263.02 ^{**}	0.043 ^{**}	382.5 ^{**}	1541.3 ^{**}
تراکم کاشت Plant density(D)	2	124215.82 ^{**}	820832.18 ^{**}	39915.44 ^{**}	0.028 ^{**}	250.6 ^{**}	995.6 ^{**}
اثر متقابل (A x D)	2	20875.29 ^{ns}	137953.39 ^{ns}	6432.27 ^{ns}	0.006 [*]	55.7 [*]	223.6 [*]
خطا Error (1)	15	6180.71	40846.48	2983.86	0.002	16.5	65.8
سال Year (Y)	1	1096644.64 ^{**}	7247156.90 ^{**}	295945.02 ^{**}	0.461 ^{**}	4097.7 ^{**}	16428 ^{**}
اثر سال بر نوع بنه (A x Y)	1	6762.81 ^{ns}	44694.71 ^{ns}	27600.02 [*]	0.025 ^{**}	218.9 ^{**}	884.1 ^{**}
اثر سال بر تراکم (D x Y)	2	81813.61 ^{**}	540663.74 ^{**}	49333.27 ^{**}	0.018 ^{**}	160.6 ^{**}	637 ^{**}
اثرات متقابل (A x D x Y)	2	37825.09 [*]	249965.48 [*]	6127.77 ^{ns}	0.002 ^{ns}	14.3 ^{ns}	58.6 ^{ns}
خطا Error (2)	18	8640.83	57101.92	3352.29	0.001	12.8	51.2

ns و ** به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و عدم اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 levels of probability and no significant, respectively.

نشان داد که تعداد گل و وزن کالاله به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تراکم بنه قرار می‌گیرد به‌طوری که بالاترین تراکم بنه (۵۵ بنه در مترمربع در مقایسه با ۳۳ بنه در مترمربع) بیشترین تعداد گل و تولید کالاله زعفران را به خود اختصاص داد (Gresta et al., 2010). افزایش تراکم بنه از ۵۰ به ۱۵۰ بنه در مترمربع، باعث کاهش وزن خشک برگ (۵۵%) و فلس (۴۱%) شد. احتمالاً به دلیل محدود شدن فضای نظر می‌رسد که با افزایش تراکم رقابت بین بنه‌های زعفران افزایش یابد که این امر باعث کاهش وزن خشک برگ به‌عنوان اندام فتوسنتز کننده شده و درنهایت کاهش سایر خصوصیات رشدی بنه‌ها را به دنبال دارد.

تراکم کاشت بر تعداد کل، وزن تر و خشک بنه‌های دختری تولیدشده در طی دو سال آزمایش تأثیر معنی‌دار داشت. درحالی که اثرات نوع بنه بر وزن تر و خشک بنه‌های دختری تولیدشده معنی‌دار نبود، همچنانین نوع بنه اثرات معنی‌داری بر تعداد بنه‌های دختری به وجود آمده داشت (جدول ۲). بیشترین تعداد بنه‌های دختری در مترمربع (۸۱۹/۶۲ گرم در مترمربع) تعداد ۲۳۵/۵ بنه در مترمربع، وزن تر (۳۱۸/۸۳ گرم در مترمربع) و وزن خشک بنه‌های دختری (۶۰ بنه بر مترمربع (d3) بود. چنانکه ملاحظه شد تراکم ۴۸ بنه در مترمربع از نظر تولید عملکرد گل مطلوب‌ترین تراکم بود، در همین ارتباط تحقیقات

Alavi Shahri et al., 1994; توصیه کرده‌اند (Mohammad-Abadi et al., 2007; Timmer & Vandervalk., 1973).

(Naderi Darbaghshahi et al., 2008) توسط بسیاری از محققین مؤید تأثیر معنی‌دار تراکم بنه بر وزن خشک زعفران می‌باشد به‌طوری‌که انتخاب تراکم مناسب بنه در زمان کاشت جهت استفاده مطلوب از منابع قابل دسترس را

جدول ۳- مقایسه میانگین اثر تراکم، نوع بنه و سال بر شاخص‌های گل و بنه زعفران

Table 3 – Mean compression for the effect of different plant densities, corm type and year on saffron flower and corm characteristics


تیمار Treatments	وزن خشک بنه Corm dry weight (g.m ⁻²)	وزن تر بنه Corm fresh weight (g.m ⁻²)	تعداد کل بنه Total corm number (No.m ⁻²)	وزن خشک (کلاله + خامه) Dry weight (Stigma +Style) (g.m ⁻²)	وزن تر گل Flower fresh weight (g.m ⁻²)	تعداد گل Flower number (No.m ⁻²)
۴۰ بنه بر مترمربع (d1: 40 Corm.m ⁻²)	162.24 ^b	417.06 ^b	136.81 ^b	0.079 ^b	7.406 ^b	14.875 ^b
۴۸ بنه بر مترمربع (d2: 48 Corm.m ⁻²)	310.52 ^a	798.25 ^a	172.75 ^b	0.160 ^a	15.125 ^a	30.250 ^a
۶۰ بنه بر مترمربع (d3: 60 Corm.m ⁻²)	318.83 ^a	819.62 ^a	235.50 ^a	0.103 ^b	9.750 ^b	19.500 ^b
LSD 5%	69.05	177.5	43.01	0.028	2.661	5.312
بنه ایرانی (a1: Iranian Corm)	257.40 ^a	661.70 ^a	140.54 ^b	0.144 ^a	13.58 ^a	27.21 ^a
بنه اسپانیایی (a2: Spanish Corm)	270.32 ^a	694.92 ^a	222.83 ^a	0.084 ^b	7.94 ^b	15.87 ^b
LSD 5%	56.37	144.93	35.11	0.023	2.17	4.34
سال اول (Y1: First year)	112.71 ^b	289.75 ^b	103.17 ^b	0.016 ^b	1.521 ^b	3.042 ^b
سال دوم (Y2: Second year)	415.01 ^a	1066.88 ^a	260.21 ^a	0.212 ^a	20 ^a	40.042 ^a
LSD 5%	56.37	144.93	35.11	0.023	2.17	4.34

در هر ستون میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک بر مبنای آزمون LSD در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنی‌دار نمی‌باشند.

Means in each column, followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test.

تعداد (۲۱/۲۱) بنه در مترمربع، وزن تر (۸۸/۱۰۶) گرم در مترمربع) و وزن خشک بنه دختری (۱۰/۱۵) گرم در مترمربع) در سال دوم آزمایش تولید شد. اثر سال علاوه بر بنه بر شاخص‌های گل زعفران نیز معنی‌دار بود به‌طوری‌که بیشترین تعداد گل (۴۲/۰۰) گرم در مترمربع)، وزن تر گل (۴۲/۰۰) گرم در مترمربع) و وزن خشک گل (۲۱/۰۰) گرم در مترمربع) در سال دوم آزمایش تولید گردید (شکل ۲).

نوع بنه بر شاخص‌های گل زعفران تأثیر معنی‌دار داشت به‌طوری‌که بیشترین تعداد گل (۲۱/۰۰)، وزن تر گل (۵۸/۱۳) گرم در مترمربع) و وزن خشک گل (۴۲/۰۰) گرم در مترمربع) طی دو سال آزمایش مربوط به بنه‌های ایرانی (a1) بود (شکل ۱). بیشترین تعداد بنه‌های دختری (۸۳/۲۲) بنه در مترمربع) متعلق به نوع اسپانیایی با وزن تر (۹۲/۶۹) گرم در مترمربع) و وزن خشک (۳۲/۲۷) گرم در مترمربع) بود. همچنین بیشترین




شکل ۱- اثر تراکم‌های مختلف کاشت، نوع بنه و سال بر تعداد گل زعفران

Figure 1 - Effect of planting density, corm type and year on number of saffron flowers.

میانگین‌های دارای حروف مشترک از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی‌دار ندارند.

Means followed by the same letters are not significantly different.



شکل ۲- اثر تراکم‌های مختلف کاشت، نوع بنه و سال بر وزن خشک زعفران

Figure 2 - Effect of planting density, corm type and year on saffron dry weight.

میانگین‌های دارای حروف مشترک از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی‌دار ندارند.

Means followed by the same letters are not significantly different.

بنه‌های ایرانی از لحاظ تولید گل از خود برتری نشان دادند
پرداختند. تولید گل در سال اول بستگی به اندازه بنه‌های کشت-
در حالی که بنه‌های اسپانیایی به تقویت اندام‌های زیرزمینی

شده دارد همچنین مدیریت تغذیه می‌تواند بر شاخص‌های گل

می باشد و این بنه ها با رشد و نمو خود تولید بنه های دختری نموده که به عنوان بذر در سال دوم محسوب می شوند و مقدار عملکرد را تعیین می کنند، بنابراین می توان گفت که به همین ترتیب مقدار عملکرد در هر سال تحت تأثیر بنه های جدید تولید شده می باشد. پژوهش بیشتر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاه زعفران در طول دوره رشد می تواند زمینه لازم را برای رسیدن به عملکرد مطلوب فراهم کند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از دو سال آزمایش ملاحظه گردید که تراکم ۴۸ بنه در مترمربع، مطلوب ترین تراکم از لحاظ تولید گل زعفران و تراکم ۶۰ بنه در مترمربع از نظر تولید بنه بود. همچنین بنه های ایرانی از لحاظ تولید گل از خود برتری نشان - دادند در حالی که بنه های اسپانیایی به تقویت اندام های زیرزمینی پرداختند. لازم به ذکر است که تولید گل در سال اول بستگی به اندازه بنه های کشت شده دارد همچنین مدیریت تغذیه می تواند بر شاخص های گل زعفران در سال های بعدی مؤثر باشد.

سپاس گزاری

هزینه های موردنیاز جهت انجام این طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت حیدریه انجام شده است که بدین وسیله از حمایت های مالی آن دانشگاه تشکر و سپاس گزاری می گردد.

زعفران در سال بعدی مؤثر باشد. بنه نقش اساسی در چرخه زندگی گیاه دارد زیرا منع ذخیره مواد فتوستنتزی موردنیاز گیاه Negbi et al., 1989 در بنه های درشت تر تقسیم سلولی بیشتر بود و به دنبال آن برگ ها زودتر رشد می کنند. رشد زودتر و ارتفاع بیشتر برگ ها، امکان استفاده بیشتر از شرایط محیطی و افزایش مواد فتوستنتزی ساخته شده را به همراه داشته و درنهایت موجب ایجاد بنه های بزرگ تر در پایان فصل رشد می گردد (Molina et al., 2004). در بررسی اثر وزن بنه بر میزان عملکرد گل زعفران در طی سه سال ملاحظه شد که توان گل آوری در بنه های ۲ گرمی وجود نداشته و این توان برای بنه های تا ۸ گرم نیز محدود می باشد ولی درصد گل آوری بنه های بالاتر از ۱۰ گرم افزایش چشمگیری داشت به طوری که بنه های درشت با تولید گل بیشتر در سال اول توانایی تولید تا $\frac{3}{5}$ کیلوگرم در هکتار زعفران خشک را دارند (Sadeqi, 1993). همچنین در تحقیقی دیگر گزارش شد که بنه هایی با وزن ۹-۱۵ گرم که بالا صله پس از خروج از خاک کشت شوند عملکرد بالاتری تولید می نمایند (Nasiri Mahallati et al., 2007). نتایج فوق در راستای مطالعات رانگاهو بود، وی نشان داد که اندازه بنه تأثیر معنی داری بر تولید بنه های دختری، تولید گل و عملکرد زعفران در سال اول و سال های بعدی دارد به طوری که افزایش اندازه بنه باعث ایجاد گل های بیشتر شده و به همان نسبت وزن گل نیز افزایش می یابد (Rangahou, 2003).

با توجه به نتایج این آزمایش، از آنجا که مقدار عملکرد زعفران در سال اول به شدت تحت تأثیر اندازه بنه و تراکم کشت

منابع

- Alavi Shahri, H., Mohajeri, M., and Folaki, M.A. 1994. Evaluation of plant density (planting distance) on saffron yield. Proceedings of 2nd Meeting of Saffron and Medicinal Plant Agronomy. Gonabad, Iran. (In

- Persian).
- Beheshti, A., and Faravani, M. 2003. Investigation the effect of different planting proportions and densities on yield and yield components of saffron and caraway mixed cropping. 3th national congress of saffron, Mashhad, Iran, 2-3 December 2003. (In Persian with English Summary).
- Gresta, F., Lombardo, G.M., and Avola, G. 2010. Saffron stigmas production as affected by soil texture. *Acta Horticulture* 850: 149-152.
- Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., and Ruberto, G. 2008. Effect of mother corm dimension and sowing time on stigma yield, daughter corms and qualitative aspects of saffron (*Crocus sativus* L.) in a Mediterranean environment. *Journal of Science Food & Agriculture* 88: 1144–1150.
- Kafi, M., Rashed Mohassel, M.H., Koocheki, A., and Molafilabi, A. 2002. Saffron, production and processing Ferdowsi University of Mashhad Press. 276 pp. (In Persian).
- Koocheki, A., Siahmarguee, A., Azizi, G., Jahani, M., and Alimoradi, L. 2009a. The effect of plant density and depth on agronomic characteristic of saffron (*Crocus sativus* L.) 3rd International symposium on saffron. Forthcoming challenges in cultivation, Research and Economics. 20-23 May 2009. Korokos, kozami, Greece.
- Koocheki, A., Tabrizi, L., Jahani, M., Mohammad-Abadi, A.A., and Mahdavi Damghani, A. 2009b. Performance of Saffron (*Crocus sativus* L.) under different planting patterns and high corm density. 3rd International symposium on Saffron. Forthcoming challenges in cultivation, Research and Economics. 20-23 May 2009. Korokos, kozami, Greece.
- Koocheki, A., Ganjeali, A., and Abbassi, F. 2007. The effect of duration and condition of incubation, weight of mother corms and photoperiod on corm and shoot characteristics of saffron plant (*Crocus sativus* L.). *Iranian Journal of Field Crops Research* 4: 315–331. (In Persian with English Summary).
- Koocheki, A., Nassiri, M., and Behdani, M.A. 2007. Agronomic attributes at saffron yield at agro ecosystems scale Iran. 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
- Mc-Gimpsey, G.A., Douglas, M.H., and Wallace, A.R. 1997. Evaluation of saffron (*Crocus sativus* L.) production in New Zealand. *New Zealand Journal of Crop and Horticulture Sciences* 25: 159-168.
- Mohammad-Abadi, A.A, Rezvani-Moghaddam, P., Sabori. A., 2007. Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (*Crocus sativus*) in Mashhad condition. 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
- Molina, R.V., Valero1, M., Navarro1, Y., Guardiola, J.L., and García-Luis, A. 2004. Temperature effects on flower formation in saffron (*Crocus sativus* L.). *Scientia Horticulture* 103: 361-379.
- Naderi-Darbaghshahi, M.R., Khajeh-Bashi, S.M., Bani-Ateba, S.A.R., and Deh-Dashti, S.M. 2008. The effects of planting method, density and depth on yield and exploitation period of saffron field (*Crocus sativus* L.) in Isfahan. *Seed and Plant Journal* 24: 643-657. (In Persian with English Summary).
- Nasiri Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand Rezazadah, Z., and Tabrizi, L. 2007. Effect of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (*Crocus sativus* L.). *Iranian Journal of Field Crops Research* 5:155–166. (In Persian with English Summary).
- Negbi, M., Dagan, B., Dror, A., and Basker, D. 1989. Growth, flowering, vegetative reproduction and dormancy in the saffron crocus (*Crocus sativus* L.). *Israel Journal of Botany* 38: 95-113.
- Rangahou, M.K. 2003. Growing saffron. The world's most expensive spice. *Crop and Food Research* 20: 1-4.

- Renau-Morata, B., Nebauer, S.G., Sánchez, M., and Molina, R.V. 2012. Effect of corm size, water Stress and cultivation conditions on photosynthesis and biomass partitioning during the vegetative growth of saffron (*Crocus sativus* L.). *Industrial Crops and Products* 39: 40–46.
- Sadeqi, B. 1993. Effect of corm weigh on saffron flower produced. Khorasan scientific and industrial research organization. annual report: 18-26. (in Persian).
- Timmer, M.J.G., and Vandervalk, G.G.M., 1973. Effect of planting density on the number and weight of Tulip daughters bulbs. *Scientia Horticulturae* 1: 193-200.

Effect of Planting Density on Flower and Corm Yield of Spanish and Iranian Saffron (*Crocus Sativus L.*)

Ramin Nazarian^{*1}, Hossein Sahabi², Hassan Feizi³, Ahmad Ahmadian⁴

1. Faculty member, College of Agriculture, Harat University, Afghanistan.

2, 3. Faculty member and Assistant Professor of Plant Production Department, Faculty of Agriculture, Torbat Heydarieh University, Iran.

4. Assistant Professor of Plant Production Department, Saffron Institute, Torbat Heydarieh University, Iran.

(*-Corresponding author E-mail: ra_nazarian@yahoo.com)

Received: 24 August, 2015

Accepted: 28 September, 2015

In order to study the effect of planting density on flower and corm yield of Spanish and Iranian saffron (*Crocus sativus L.*) types, an experiment was arranged in factorial with randomized complete block design with three replications. This experiment was conducted on the Research Farm of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad in 2013-15. The saffron corm type was considered in two levels (a1: Iranian corm and a2: Spanish corm) and the planting densities were in three levels (d1:40, d2:48 and d3:60 corm.m⁻²). The two year results showed that the effect of different planting density and saffron corm types on the number of flowers, flower fresh and dry weight (stigma + style) and number of replacement corms were significant ($P<0.01$) while, the effect of corm type on fresh and dry weight of replacement corms was not significant. The highest number of flowers (30.25 No.m⁻²), flower fresh weight (15.125 g. m⁻²) and (stigma + style) dry weight (0.16 g.m⁻²) were obtained in d2 (48 corm.m⁻²), respectively. Corm type had significant effects on saffron flower characteristics. The highest numbers of flowers (27.21 No.m⁻²), flower fresh weight (13.58 g.m⁻²) and (stigma + style) dry weight (0.144 g.m⁻²) were obtained from Iranian corms (a1), respectively. However, the highest number (222.83 No.m⁻²), fresh weight (694.92 g.m⁻²) and dry weight (270.32 g.m⁻²) of replacement corms were obtained from Spanish corms (a2), respectively. The years had significant effects on saffron flower and corm characteristics as the highest amounts were obtained in second year (Y2), respectively.

Keywords: Replacement Corms, Corm density, Saffron yield.